



<b>CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER</b>		Doc. nº. CAISM/ONCO14
Área de Oncologia	Enfermaria de Oncologia	Página 1 de 1
Título do Procedimento: Terapia Nutricional		Data de Emissão: 06/2006
		Revisão nº.

- *Dietas*: geral; com resíduo; sem resíduo; líquida; branda; pastosa; para diabética; para hipertensa; para nefropata, para hepatopata.
- pacientes hospitalizadas (fórmula de Harris-Benedict):  $655 + (9,6 \times \text{peso}) + (1,8 \times \text{altura}) - (4,7 \times \text{idade}) = \text{Kcal}$  (Peso=Kg, altura=cm, idade=anos).
- Em *pacientes com soro* acrescentar em cada frasco: 1 ampola de vitamina C; 1 ampola de complexo B; 1 ampola de 10ml de KCl a 19,1% e 1 ampola de 10ml de NaCl a 20%.
- A alimentação através da *sonda de Dobhoff* está indicada quando a paciente não estiver se alimentando e não houver necessidade de descanso intestinal.
- *Nutrição Parenteral (NPP)* está indicada em pacientes com severa depleção protéica e/ou que necessitem de repouso das alças intestinais. Está indicada nas portadoras de carcinoma de ovário em tratamento, nas enterites actínicas e quando a paciente for submetida a cirurgias, geralmente derivações. O controle da paciente em NPP é feito com exame clínico (peso), sódio, potássio, cloro, uréia, creatinina e glicemia. *Estes exames serão diários durante uma semana e então bi-semanais.* Semanalmente dosar cálcio, magnésio, fósforo, transaminases, bilirrubinas e realizar proteinograma e hemograma.

Elaborado por: Luiz Carlos Teixeira e Joana Fróes Bragança Bastos			Data: 06/2006
Revisado por:			Data:
Aprovação da Supervisão:	Data:	Aprovação Direção:	Data: