



CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER		Doc. nº. CAISM/ONCO17
Área de Oncologia	Enfermaria de Oncologia	Página 1 de 2
Título do Procedimento: Auto-Transfusão / Pré-Depósito		Data de Emissão: 06/2006
		Revisão nº.

Auto-Transfusão Pré-Depósito – Orientações para o cirurgião

Objetivos

- Estabelecer rotina para procedimento de transfusão autóloga em pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos, diminuindo a utilização de sangue homologado.

Princípio / Aplicação

- Aplica-se a pacientes que se submeterão a cirurgias com grande chance de necessitar de suporte hemoterápico (2 unidades de Concentrados de hemácias ou mais)

Procedimentos

- Encaminhar o paciente com relatório médico contendo **diagnóstico, doença de base, doenças associadas, número do HC, data da cirurgia.**
- Providenciar o prontuário do paciente. (Se não for possível, fazer relatório bem completo)
- A inclusão do paciente no programa, volume a ser colhido e intervalo entre cada coleta serão definidos pelo hemoterapeuta.
- Será seguido o padrão de reserva cirúrgica (sistema informativo do centro cirúrgico ou padronização da unidade) para cada cirurgia.
- **Pacientes com mais de 45anos deverão ter ECG, mesmo assintomáticos**
- Encaminhar os pacientes no mínimo 35 dias antes da cirurgia, para que seja possível a avaliação e coleta do número de bolsas necessário.

Elaborado por: HEMOCENTRO e Joana Fróes Bragança Bastos			Data: 06/2006
Revisado por:			Data:
Aprovação da Supervisão:	Data:	Aprovação Direção:	Data:



CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER		Doc. nº. CAISM/ONCO17
Área de Oncologia	Enfermaria de Oncologia	Página 2 de 2
Título do Procedimento: Auto-Transfusão / Pré-Depósito		Data de Emissão: 06/2006
		Revisão nº.

Reposição de Ferro

- Sulfato ferroso em dose terapêutica (15mg/kg/dia – pacientes com 70kg = 4cps/dia) . Prescrever 2cps VO 1 hora antes das refeições (almoço e jantar)

A seleção dos pacientes será feita com base nos critérios a seguir:

Critérios de inclusão

- Hb =11 g/dl
- Idade entre 12 e 65 anos (fora desta faixa etária será feita uma avaliação individual)
- Peso mínimo de 30kg

Critérios de exclusão

Cardiopatas com contra-indicação absoluta:

- estenose aórtica significativa
- angina instável com episódios freqüentes e/ou prolongados
- episódios de IAM nos últimos 6 meses
- doença coronariana importante
- cardiopatia cianótica
- hipertensão arterial não-controlada

Outros

- Infecção bacteriana ativa (inclusive sintomas intestinais no primeiro dia da doação)
- Gestantes com quadro de hipertensão, pré-eclâmpsia, diabetes mellitus, ou associado ao baixo fluxo placentário e/ou retardo do crescimento intra-uterino.
- Paciente com epilepsia mal controlada ou episódio convulsivo no último ano. Os demais casos com antecedente de convulsão serão avaliados pelo hemoterapeuta.

Obs: o paciente deve evitar alimentação copiosa previamente à doação

Elaborado por: HEMOCENTRO e Joana Fróes Bragança Bastos		Data: 06/2006
Revisado por:		Data:
Aprovação da Supervisão:	Data:	Aprovação Direção: Data: