



<b>CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER</b>		Doc. nº. CAISM/ONCO25
Área de Oncologia	Enfermaria de Oncologia	Página 1 de 2
Título do Procedimento: Paracentese		Data de Emissão: 06/2006
		Revisão nº.

Deverá ser realizada para o diagnóstico da presença e da etiologia da ascite, com colheita do líquido ascítico para exames de citologia oncológica e bioquímica. Pode-se também realizar a drenagem para alívio quando a quantidade da ascite está causando desconforto abdominal e restrição respiratória. Usualmente é realizado após o exame de ultra-som abdominal total para o diagnóstico e orientação do local da punção.

O procedimento é realizado pela equipe médica com o auxílio da equipe da enfermagem.

#### **Descrição do procedimento:**

- A cliente deverá estar deitada da maneira mais confortável possível.
- Realiza-se a assepsia e a antisepsia da paciente e do médico.
- O médico deverá estar de avental descartável, gorro, máscara e luvas estéreis.
- Colocação de campo estéril no abdome, na região da fossa ilíaca esquerda.
- Anestesia local na meia distância entre o umbigo e a crista ilíaca esquerda com seringa de 10ml, aspiração da xilocaina com agulha 12G, realizando-se botão anestésico da pele e do trajeto com agulha de insulina 8G.
- Punção com agulha abocath 14 a 16 ou intracath longo de uma via de grosso calibre, se a cliente for muito obesa ou o conteúdo muito espesso.
- Após a passagem da aponeurose através da sensação de resistência subitamente vencida, retirar o guia e aspirar para avaliar a saída de líquido ascítico e ou possível sangramento pelo procedimento.
- Colher o líquido ascítico para exame oncológico e bioquímica.
- Após a fixação do abocath, acoplar em equipo de soro para drenagem do líquido ascítico em um frasco a um nível mais baixo que o da cliente, deixando o líquido fluir passivamente.

Elaborado por: Áurea Akemi Abe Cairo e Joana Fróes Bragança Bastos			Data: 06/2006
Revisado por:			Data:
Aprovação da Supervisão:	Data:	Aprovação Direção:	Data:



<b>CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER</b>		Doc. nº. CAISM/ONCO25
Área de Oncologia	Enfermaria de Oncologia	Página 2 de 2
Título do Procedimento: Paracentese		Data de Emissão: 06/2006
		Revisão nº.

- A drenagem deverá ser interrompida quando houver melhora dos sintomas compressivos causados pela quantidade da ascite ou se a cliente apresentar sinais de quaisquer instabilidades cardiovasculares.
- Manter a cliente sob observação e monitorização dos sinais vitais após o procedimento.

Elaborado por: Áurea Akemi Abe Cairo e Joana Fróes Bragança Bastos			Data: 06/2006
Revisado por:			Data:
Aprovação da Supervisão:	Data:	Aprovação Direção:	Data: