

	Doc. Nº 01
PROTOCOLO DE INIBIÇÃO DE LACTAÇÃO – CAISM/UNICAMP	Data de emissão: Ago/2008 Atualização: Set/2020

PROTOCOLO DE INIBIÇÃO DE LACTAÇÃO

I. INDICAÇÕES:

1. Indicações da inibição da lactação (antes da apojadura):

A. Fetais

- óbito fetal ou neonatal precoce;
- malformações congênitas que impossibilitem a sucção.

B. Maternas

- doenças debilitantes;
- doenças infectocontagiosas (HIV positivo/ TBC bacilífera*);
- * a discutir conforme condição social
- uso de drogas anti-metabólicas;
- mamoplastias com ressecção de ductos;
- câncer de mama;
- casos sociais.

2. Indicações da supressão da lactação (após a apojadura):

A. Fetais:

- óbito neonatal;
- intolerância ao leite materno.

B. Maternas:

- complicações puerperais debilitantes;
- mamoplastia eventualmente;
- fistula láctea (após drenagem de abscesso mamário);

	Doc. Nº 01
PROTOCOLO DE INIBIÇÃO DE LACTAÇÃO – CAISM/UNICAMP	Data de emissão: Ago/2008 Atualização: Set/2020

- malformação de mamilo.

II - CONDUCTA:

1. Medidas Gerais:

- Isolar paciente de outras puérperas lactantes;
- Evitar estímulo mamário:
 - não estimular mamilos;
 - evitar o esvaziamento mamário;
 - enfaixamento precoce das mamas.

2. Medidas Específicas: (Hormonais)

- **Dostinex (cabergolina):** 01 comprimido = 0,5mg
 - o É a medicação de escolha e padronizada no serviço por maior facilidade de adesão ao tratamento, menor custo e menos efeitos colaterais, quando comparado ao Parlodel (bromoergocriptina).
 - o Os efeitos colaterais mais comuns são sonolência e hipotensão postural.
 - o Não deve ser utilizado em mulheres hipertensas, e em mulheres em que seja contra-indicado o uso de derivados de ergot, a menos que os potenciais benefícios justifiquem os possíveis riscos.
 - o Dose:
 - Para inibição da lactação: 02 comprimidos (1mg) VO em dose única, junto com a refeição, no primeiro dia pós-parto.
 - Para supressão da lactação já estabelecida: 0,5 comprimido (0,25mg) VO a cada 12 horas por 2 dias.

	Doc. Nº 01
PROTOCOLO DE INIBIÇÃO DE LACTAÇÃO – CAISM/UNICAMP	Data de emissão: Ago/2008 Atualização: Set/2020

OBS.: doses mais baixas deverão ser consideradas para pacientes com insuficiência hepática grave.

III – ESCOLHA DO MÉTODO

1. Inibição da lactação

- * Gestação até 28 semanas ou peso < 750 gramas: medidas gerais;
- * Gestação acima de 28 semanas ou peso > 750 gramas: medidas gerais + medidas específicas (métodos hormonais).

2. Supressão da lactação

- * Medidas gerais + medidas específicas

OBS.: a anticoncepção deverá ser estabelecida em 30 dias.

Elaborado por: Adriana Gomes Luz, Giuliane Jesus Lajos	Data: ago/2008 Revisado: 09/2020
Aprovação Direção: Helaine Milanez	Data: 09/09/2020